

A VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁSA

AZ AMERIKAI SZŐLŐKABÓCA ELLEN

SOMLÓ, NAGYGYIMÓT, NEMESSZALÓK

KÖRÜLHATÁROLT TERÜLETEIRE

2026/II.

A VÉDEKEZÉS ELVÉGZÉSE MINDEN SZŐLŐTERMELŐ SZÁMÁRA KÖTELEZŐ!

1. INDOKLÁS

A július 27-én a Somlón elvégzett felmérések során a kabóca utolsó és utolsó előtti (L₄-L₅) lárvastádiumú egyedeit lehetett azonosítani helyenként jelentős mennyiségben. Ez arra utal, hogy a felhívással érintett körülhatárolt területeken feltehetőleg augusztus 8. napját követően az amerikai szőlőkabóca egyedi már teljesen kifejlődnek repülésre is képes alakra.

Bővebb információ az FD-ről és az amerikai szőlőkabócáról az alábbi linken érhető el:
<https://portal.nebih.gov.hu/fd-betegseg>

2. JOGSZABÁLYI ALAP ÉS SZANKCIÓK

Az (EU) 2016/2031 rendelet, a 2008. évi XLVI. törvény és a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet jogszabályi előírásaival összhangban az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés kötelező. A kezeléseket a közzétett védekezési felhívásokban meghatározott időzítés figyelembevételével szükséges elvégezni. A mulasztás növényvédelmi bírságot, a támogatások megvonását vagy az ültetvény kivágását vonhatja maga után.

3. HATÁRIDŐK ÉS ÜTEMEZÉS

	Védekezési időszak	Stádium
3. kötelező védekezés	2026.08.08-2026.08.16	Imágó

4. ENGEDÉLYEZETT SZEREK

Részletes lista az 1. sz. mellékletben vagy az alábbi linken:

<https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1504431079/Engedelyezett+rovarolo+szerek.pdf>

5. HASZNOS TUDNIVALÓK A HATÉKONYSÁGÉRT

- Amennyiben nem történt törzstisztítás akkor a törzshajtásokat is permetezze.
- Permetlé fedettsége: védekezési időszak alatt várható magas hőmérséklet miatt nagyobb cseppméret és nagyobb permetlé mennyiség válhat szükségessé.

- Bővebb információ és technológiai segédlet:

KONVENCIONÁLIS

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara honlapján az „Amerikai szőlőkabóca - Integrált növényvédelmi technológia összefoglalása” link alatt

ÖKOLÓGIAI MŰVELÉS

Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet honlapján „Az arany színű sárgaság és az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ajánlott technológiája ökológiai művelésben - Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet” link alatt

6. NÖVÉNYVÉDELMI FELÜGYELŐK ELÉRHETŐSÉGE

Bővebb információért forduljon bizalommal:

Mohos Róbert növényvédelmi felügyelő; telefon: +36-20/569-65-44

Lakics Dávid növényvédelmi felügyelő; telefon: +36-70/458-96-73

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

**Fröhlichné Hamar Edit főispán
nevében és megbízásából:**

**Odor Tamás
osztályvezető**



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, mint növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró szerv (továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv) a szőlő arany színű sárgaság betegséget okozó fitoplazma (*Grapevine flavescencedorée phytoplasma*) zárlati károsítót terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen az alábbi 2026. évre vonatkozó második védekezési felhívást teszi közzé a Somló, valamint Nemesszalók és Nagygyimót települések környezetében – a mellékelt térképek szerint – kijelölt körülhatárolt területek vonatkozásában:

VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS 2026/II.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 2026. évben is folyamatosan vizsgálta a körülhatárolt területeken az amerikai szőlőkabóca (*Scaphoideus titanus*) szőlőnövényeken való elhelyezkedését, egyedfejlődését, valamint egyedszámának és betelepülésének alakulását. Az idén elvégzett növényvizsgálatok alapján elmondható, hogy az amerikai szőlőkabóca lárvái – különösen a fiatal egyedek (L_1 - L_3) - döntően a szőlőnövények talaj közeli részén, jellemzően a törzshajtásokon voltak fellelhetők. Fontos megjegyezni, hogy a kifejlett alakok is előfordultak a szőlőnövények törzshajtásain. A kabóca ez évi egyedfejlődéséről elmondható, hogy a legfiatalabb egyedek (L_1) május közepétől egészen július első hetéig megtalálhatóak voltak, tehát körülbelül 7 hétig elhúzódott a tojások kelése. A július 27-én a Somlón elvégzett felmérések során még a kabóca utolsó és utolsó előtti (L_4 - L_5) lárvastádiumú egyedeit lehetett azonosítani helyenként jelentős mennyiségben. Ez arra utalt, hogy a felhívással érintett körülhatárolt területeken feltehetőleg augusztus 8. napját követően az amerikai szőlőkabóca egyedi már teljesen kifejlődnek repülésre is képes alakra. Ezt támasztják alá az augusztus 3. napján ellenőrzött sárgalapok fogási számai, melyek emelkedést mutatottak az egy héttel korábbi eredményekhez képest. Emellett a vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a Badacsonyi és a Balaton-felvidéki borvidékekhez képest nagyobb egyedszámmal fogtak a kihelyezett sárgalapok kifejlett alakot (továbbiakban: imágó).

A vizsgálatok eredményei alapján, ezért **a harmadik kötelező védekezést augusztus 8. napjától augusztus 16. napjáig szükséges elvégezni a körülhatárolt területek minden szőlőtermő területén.**

Az amerikai szőlőkabóca ellen a felhívás 1. számú mellékletében található táblázatban szereplő rovarölő szerek alkalmazhatók.

Mivel a táblázat a növényvédő szerek jelen felhívás kiadásának napján hatályos engedélyokiratai alapján készült, ezért az engedélyokiratokban történt módosításokat a készítmény felhasználása előtt ellenőrizni szükséges!

Lényeges, hogy a kezelés során olyan növényvédő szert használjon a szőlőtermelő, amely a kijuttatás fenostádiumában még engedélyezett, az élelmezés-egészségügyi várakozási idő pedig betartható legyen, valamint **az engedélyokirat által előírt növényvédelmi technológia pedig nem zárja ki a kifejezett alak elleni alkalmazását**. Ez utóbbi azért is lényeges, mert a kötelező védekezési időszakban a vizsgálatok alapján jellemzően csak imágók lesznek jelen a szőlőnövényeken.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felhívja a szőlőtermelők figyelmét, hogy mivel az imágók a törzshajtásokon is előfordulnak, így ha a törzshajtások eltávolítása nem történt meg, **a kezeléseknak a szőlőnövények törzsön lévő hajtásaira is irányulnia kell**. Továbbá a kötelező védekezési időszak alatt várható magas hőmérséklet miatt nagyobb cseppméret és nagyobb permetlé mennyiség válhat szükségessé.

Fontos hangsúlyozni, hogy a növényvédő szerek kijuttatása önmagukban nem elegendőek, hanem a hatékonyságukat ellenőrizni is kell, és szükség esetén – valamint a további esetleges betelepülések miatt – a kezelés megismétlése indokoltá válhat. A védekezés hatékonyságának ellenőrzése, valamint a betelepülés ellenőrzése növényvizsgálattal, valamint sárga ragacslapok kihelyezésével végezhető el. A sárga ragacslapot közvetlenül a 3. kötelező kezelés megkezdése előtt célszerű kihelyezni, melyet 7-10 naponként cserélni szükséges. Az amerikai szőlőkabóca egyedszáma miatt szükségessé válhat az ismételt kezelés a betakarítás után is. Mivel a szőlőben az amerikai szőlőkabóca ellen engedélyezett növényvédő szerek engedélyokiratai – a Pyregard, az Aza és a NeemAzal-T/S kivételével – nem teszik lehetővé a növényvédő szerek felhasználását szüret után, a tavalyi évhez hasonlóan a NÉBIH a honlapján közleményben közzéteszi azon készítményeket, amelyek felhasználását engedélyezi.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv tájékoztatja a **Pyregard** rovarölő szer felhasználását tervezőket, hogy a készítmény felhasználása a területen szerződött növényvédelmi szakirányító által kitöltött, és az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által jóváhagyott adattalappal lehetséges.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felhívja a szőlőtermelők figyelmét, hogy a védekezés során az integrált növényvédelem alapelveinek érvényre jutása érdekében a növényvédelmi technológia meghatározása során figyelemmel kell lenni a rezisztencia kialakulásának megelőzésére, ezért a növényvédő szerek okirataiban meghatározott kezelések évenkénti maximális számának betartása mindenkor szükséges.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv vizsgálata szerint, a szőlő sárgaság betegség tipikus tünetei az idei évben már megjelentek. A levelek sodródása és a levéllemezek elszíneződése megkezdődött, valamint a virágzatok elszáradása már megtörtént, egyes fajtáknál a kialakult bogyók töppedése is folyamatban van. A vonatkozó jogszabályok szerint a tünetes szőlő növények azonosítását követően, annak bejelentése kötelező az élelmiszerlánc felügyeleti szerv részére, a bejelentés a kártalanítás feltétele is.

Az eredményes védekezés feltétele, hogy minden szőlőtermelő védekezzen a védekezési felhívások figyelembevételével, és ne veszélyeztesse a szomszédos termelők növényvédelmi, növényegészségügyi biztonságát a védekezés elmulasztásával.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

**Fröhlicsné Hamar Edit főispán
nevében és megbízásából:**

**Odor Tamás
osztályvezető**

Kapják:

1. Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Veszprém vármegyei Szervezete (elektronikusan)
2. Somlói Borvidék Hegyközsége (elektronikusan)
3. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növényvédelmi Igazgatósága (ni@nebih.gov.hu)
4. Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (hnt@hnt.hu)
5. A körülhatárolással érintett települések polgármesteri hivatalai

1. sz. melléklet

Szőlőben kabócafajok ellen engedélyezett rovarölő szerek

Készítmény	Hatóanyag	Forgalmi kategória	Az utolsó kezelés fenostádiuma	ÉVI (nap)	A kezelés évenkénti maximális száma	Alkalmasság a lárvák és/vagy az imágók elleni védekezésre	Hatás-mechanizmus	Méh-veszélyesség
Decis	deltametrin	III.	zsendülés (BBCH 85)	7	2	lárva, imágó	kontakt	mérsékelt kockázatos
Decis Forte (származtatott: Detector, Nuyard)	deltametrin	I. II.	zsendülés (BBCH 85)	30 (borszőlő) 7 (csemegeszőlő)	2	lárva, imágó	kontakt	mérsékelt kockázatos**
Decis Mega	deltametrin	II.	zsendülés (BBCH 85)	7	3	lárva, imágó	kontakt	mérsékelt kockázatos**
Exirel (származtatott: Irazu)	ciántraniliprol	I. II.	zsendülés (BBCH 85)	14	2	lárva	szisztemikus	kifejezetten veszélyes
Karate Zeon 5 CS (származtatott: Full 5 CS, Kendo 5 CS, NinjaZeon 5 CS); (párhuzamos: Karate Zeon, Karate Zeon 050 CS)	lambda-cihalotrin	II. III.	fűtzáródás (BBCH 78)	7	2	lárva, imágó	kontakt	mérsékelt kockázatos**
Lamdex Extra (származtatott: Axiendo 2,5 WG, La-Cy Extra)	lambda-cihalotrin	III.	fűtzáródás (BBCH 78)	7	2	lárva, imágó	kontakt	mérsékelt veszélyes**
Klartan 24 EW (származtatott: Mavrik 24 EW, Monospel 24 EW)	tau-fluvalinát	I. II.	érés kezdete, bogyszíneződés (BBCH 80)	21	2	lárva, imágó	kontakt	nem jelölésköteles
Sanium System (származtatott: Deltam System)	flupiradifuron	II. III.	érés kezdete (BBCH 82)	14	1	lárva, imágó	szisztemikus	nem jelölésköteles
Sivanto Prime (párhuzamos: Sivanto Prime 200 SL)	flupiradifuron	I. II.	zsendülés (BBCH 81)	14	1	lárva, imágó	szisztemikus	nem jelölésköteles***
Sivanto Energy (párhuzamos: Sivanto Energy 85 EC)	deltametrin + flupiradifuron	I.	érés kezdete (BBCH 81)	14	2	lárva, imágó	kontakt és szisztemikus	kifejezetten veszélyes
Sumi Alfa 5 EC	eszfenvalerát	I.	fűtzáródás végéig (BBCH 55-79)	14	2	lárva, imágó	kontakt	mérsékelt kockázatos**
Sumi Alfa 5 EW (származtatott: Sumicidin 5 EW)	eszfenvalerát	I.	fűtzáródás végéig (BBCH 55-79)	14	2	lárva, imágó	kontakt	mérsékelt kockázatos**

Szőlőben kabócafajok ellen szükséghelyzeti felhasználásra engedélyezett rovarölő szerek

Készítmény	Hatóanyag	Forgalmi kategória	Az utolsó kezelés fenostádiuma	ÉVI (nap)	A kezelések maximális száma egy tenyészidőszakban	Alkalmasság a lárvák és/vagy az imágók elleni védekezésre	Hatásmechanizmus	Kijuttatási időszak
Carnadine (származtatott: Roslix, Silentium); (párhuzamos: Carnadine, Carnadine 200, Roslix)	acetamiprid	I. II.	zsendülésig (BBCH 70-85)	7	1	lárva	szisztémikus	2026.04.21.- 2026.08.18.

Csak szőlő alanytelepen felhasználható kabócafajok ellen engedélyezett rovarölő szerek

Készítmény	Hatóanyag	Forgalmi kategória	Az utolsó kezelés fenostádiuma	ÉVI (nap)	A kezelés évenkénti maximális száma	Alkalmasság a lárvák és/vagy az imágók elleni védekezésre	Hatás-mechanizmus	Méhveszélyesség
Mospilan 20 SG * (származtatott: Gazelle 20 SG *, Mospilan 20 SG Original *, Rafting *, Spilan 20 SG *); (párhuzamos: Mospilan SG *)	acetamiprid	I. II. III.	érés (BBCH 15-82)	-	1	lárva	szisztémikus	nem jelölésköteles

Szőlőben ökológiai termesztésben is felhasználható kabócafajok ellen engedélyezett rovarölő szerek

Készítmény	Hatóanyag	Forgalmi kategória	Az utolsó kezelés fenostádiuma	ÉVI (nap)	A kezelés évenkénti maximális száma	Alkalmasság a lárvák és/vagy az imágók elleni védekezésre	Hatás-mechanizmus	Méh-veszélyesség
Laser (származtatott: Nexsuba)	spinozad	II.	két héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)	7	2	lárva	kontakt	mérsékelten kockázatos**
Laser Duplo	spinozad	II. III.	két héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)	7	2	lárva	kontakt	mérsékelten kockázatos**
Limocide	narancsolaj	II.	fogyasztásra érettségig (BBCH 89)	1	6	lárva, imágó	kontakt	kifejezetten kockázatos
Oroganic (származtatott: Sinala, PREV-GOLD GARDEN, PREV-GOLD)	narancsolaj	II., III.	fogyasztásra érettségig (BBCH 89)	előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges	6	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten kockázatos


Szőlőben ökológiai termesztésben is felhasználható kabócafajok ellen szükséghelyzeti felhasználásra engedélyezett rovarölő szerek

Készítmény	Hatóanyag	Forgalmi kategória	Az utolsó kezelés fenostádiuma	ÉVI (nap)	A kezelés évenkénti maximális száma	Alkalmasság a lárvák és/vagy az imágók elleni védekezésre	Hatásmechanizmus	Kijuttatási időszak	Méh-veszélyesség
NeemAzal-T/S	azadirachtin A	II. III.	-	3	2	lárva, imágó	nem ismert (IRAC MoA: UN)	2026.05.11.- 2026.09.07.	nem jelölésköteles
Aza	azadirachtin A	II.	-	3	2	lárva, imágó	nem ismert (IRAC MoA: UN)	2026.05.11.- 2026.09.07.	nem jelölésköteles
Pyregard	piretrin	I.	-	7	A készítményt vagy bármely más piretrin hatóanyagot tartalmazó készítményt ugyanazon a területen maximum kétszeri felhasználással lehet kijuttatni a teljes vegetáció alatt.	lárva, imágó	kontakt	2026.07.17.- 2026.11.13.	kifejezetten kockázatos

** virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki.

*** tebukonazol tartalmú növényvédő szerrel együtt tankkeverékként alkalmazva, virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki

Körülhatárolt terület



Jelmagyarázat


Pufferzóna határa



Fertőzött terület határa



Körülhatárolt terület



Körülhatárolt terület

Nagygyimót

Jelmagyarázat

Pufferzóna határa



Fertőzött terület határa

